



COVID-19 andmed seisuga 12.09.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–12.09.2022 registreeriti 718 198 haigusjuhtu, sealhulgas 599 493 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 54 041, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 109.

Seisuga 12.09.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 341,7, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 130,6.

36. nädala jooksul lisandus 2262 haigusjuhtu (914 laboratoorselt kinnitatud ja 1348 kliiniliselt diagnoositud). Eelmise nädalaga võrreldes üldhaigestumus ei muutunud, samal ajal laboratoorselt kinnitatud juhtude arv suurenes 11,2% võrra ja kliiniliselt diagnoositud juhtude arv vähenes 7,5% võrra.


36. nädalal tehti 7073 testi (533 testi 100 000 el. kohta), testide arv püsis kõikides vanusrühmades stabiilsena.

Positiivsete testide osakaal kasvas laste seas keskmiselt 23,5% võrra. Üle 60 a seas kasvas positiivsete testide osakaal 18,1% võrra.

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud)

Haigestumus on kasvutrendis laste seas, suurem kasv oli 10-14- (100%) ja 5-9-aastaste (40%) seas. Haigestumus on languses 20-29-aastaste seas (19%) ning 40-49-aastaste ja 75-79-aastaste seas (20%).


Haigestumus vanusrühmides 100 000 el kohta, 35.–36. n 2022



Hospitaliseerimised

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine**. 7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on kasvanud 4,7 pealt 5,1 peale.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



36. nädalal hospitaliseeriti 101 inimest, võrreldes 35. nädalaga hospitaliseerimiste arv suurenes 31,2% võrra. 101-st hospitaliseeritust 36 olid hospitaliseeritud sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 32).

Seisuga 12.09.2022 viibib haiglaravil 104 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 1 patsient, juhitalval hingamisel 1 patsient.

Seisuga 12.09.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 73 aastat (eelmisel nädalal oli samuti 73, ei muutunud). Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 84,6% patsientide üldarvust.

Tuleb arvestada, et kooliealiste seas toimunud haigestumise kasv võib mõne nädala möödudes avaldada mõju ka hospitaliseeritute arvule.

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 825 patsienti (3,9% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Seisuga 12.09.2022 on intensiivravil 1 patsient, sümptomaatilise COVIDi tõttu ei ole.

Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustes on kasvanud haigestunute arv. Kokku registreeriti 36. nädalal 31 nakatunut (eelmisel nädalal 17 nakatunut), mis moodustas 1,37% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (2279). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 1 inimene, mis moodustab 0,99% kõigist hospitaliseeritutest, surmajuhte ei lisandunud.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes tuvastatud kollete arv on jäänud samaks, küll aga on suurenenud kolletes haigestunute arv. Seisuga 11.09.2022 on kokku koldeid 4, milles haigestunuid on kokku 60.

Regionaal- osakond	Kollete arv	35. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	1	7	3	10	10
LäRO	2	18	2	22	6
LõRO	1	4	3	7	0
KOKKU	4	29	8	39	16

Regionaal- osakond	Kollete arv	36. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	1	6	0	6	3	↓
LäRO	2	37	6	43	21	↑
LõRO	1	8	3	11	8	↑
KOKKU	4	51	9	60	32	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.


Suremus

36. nädalal suri 4 inimest, keskmine vanus 87,3 a, neist vaksineerimata 3 inimest (75%). Vaksineerimise kuur lõpetatud ühel inimesel. Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 35. nädalaga märgatavalt ei ole muutunud – 0,6.


Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaksineerimata inimeste osakaal 58,1%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaksineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 12.09.2022 surmaga lõppenud 2 660 haigusjuhtu ehk 0,4% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,7% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 310 (49,2 %) ja naisi 1 350 (50,8%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,6% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.




Vaktsineerimine

36. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 315, pooleli oleva kuuriga isikuid 42 ning lõpetatud kuuriga isikuid 557.



36. nädalal jagunesid COVID-19 tõttu hospitaliseeritud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 12, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 10.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse jõudis hooajavälisele ehk tavapärasele foonnäitajatele ning registreeritud andmete põhjal võib hinnata haigestumuse intensiivsust madalaks.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 181 uut HIV-nakkust, sh 93 (ehk 51%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 365 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

12.09.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 10 ahvirõugetesse nakatunut (viimase kahe nädala jooksul uusi juhte ei lisandunud). Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisirõugel või olnud lähikontaktis välismaalastega.