



COVID-19 andmed seisuga 21.11.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–21.11.2022 registreeriti 752 944 haigusjuhtu, sealhulgas 608 759 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 56 609, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 769.

Seisuga 21.11.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 332, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 73,8.

46. nädala jooksul lisandus 2224 haigusjuhtu (491 laboratoorselt kinnitatud ja 1733 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 22,1% juhtudest.


Eelmise nädalaga võrreldes suurenes haigusjuhtude arv 1,5% võrra, sh kliiniliselt diagnoositud 1,9% võrra ning laboratoorselt kinnitatud juhtude arv ei muutunud (+1 haigusjuht).

46. nädalal tehti 7790 testi (586 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 8,0%, mis on võrreldes eelmise nädalaga vähenenud (10% võrra).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)


Haigestumus on jätkuvalt kasvutrendis laste seas, suurem kasv täheldati vanuses 5-9a. Suuremat langust täheldati vanuses 80-84a ja 70-74.

Haigestumus vanusrühmades 100 000 el. kohta, 45.–46. nädal 2022



Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja (arvutatud hospitaliseeritute põhjal) on üle-eestiliselt 0,81.

Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on veidike suurenenud 5,7 pealt 5,9 peale.

46. nädalal hospitaliseeriti 103 inimest, haiglaravile suunatud patsientide arv vähenes 45. nädalaga võrreldes 37% võrra. Hospitaliseeritutest oli 42 patsienti sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 50) ning ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 21.11.2022 viibib haiglaravil 146 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 3 patsienti, juhitalval hingamisel 1 patsient.

Seisuga 21.11.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 72 aastat (eelmisel nädalal oli 73). Üle 60-a hospitaliseeritud patsientide osakaal ei muutunud võrreldes eelmise nädalaga ja moodustab 84,2% patsientide üldarvust.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 849 patsienti (3,7% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 46. nädalal 16 nakatunut (eelmisel nädalal oli 22 nakatunut), mis moodustas 0,7% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (2224). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 1 inimene, mis moodustab 1,0% kõigist hospitaliseeritutest. Surnuid ei lisandunud.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on võrreldes möödunud nädalatega vähenenud. Koldeid ei ole tuvastatud kolmes regioonis. Seisuga 20.11.2022 on kokku koldeid 2 (eelmisel nädalal 4), milles haigestunuid on kokku 16 (eelmine nädal 73). Viimase 7 päevaga tuvastatud uute nakatunute arv on jäänud samaks.

Regionaal- osakond	Kollete arv	45. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↓
IRO	1	34	4	38	9	↑
LäRO	3	31	4	35	9	↓
LõRO	0	0	0	0	0	↓
KOKKU	4	65	8	73	18	

Regionaal- osakond	Kollete arv	46. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↓
LäRO	0	0	0	0	0	↓
LõRO	2	16	0	16	16	↑
KOKKU	2	16	0	16	16	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal jätkuvalt moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Omikroni BA.5.2 järglase BF.7 alamvariandi osakaal püsib stabiilsena, BQ.1 alamvariandi osakaal hakkab tõusma, moodustades 25% kõikidest sekveneeritud proovidest.

Reoveeseire

46. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees mõnevõrra vähenenud. Seiratud asulaproovidest enamus, ca 57% ulatuses oli oranžil ja 40% kollasel ohutasemel. Punase ohutasemel määratud viiruse osakaal on viimasel ajal vähenenud.

Koostaja: Nakkushaiguste osakond

Keskmetatud proovidest kõige kõrgem viirusosakeste sisaldus määrati Jõhvi-Ahtmes, Ahtmes ning Haapsalus.

Sentinel seire andmed

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu (sentinel-seire) arvatud etioloogilise struktuuri põhjal 46. nädalal oli peamiseks haigestumise põhjustajaks jätkuvalt rinoviirus, moodustades 21,9% kõikidest positiivse kinnituse saanud sentinel-proovidest. Muud olulised haigestumise põhjustajad olid RS-viirus ning SARS-CoV-2.

Suremus

46. nädalal suri 9 inimest, keskmine vanus 78,3 a, neist 2 vaktsineerimata ja 7 vaktsineeritud, mis moodustab kõikidest surmajuhtumitest 77,8% (sh 2 põhikuuriga, 5 saanud ühe lisa- või tõhustusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Kahel inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on langenud võrreldes 45. nädalaga – 1,29 (oli 2,14).


Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 52,2%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.

Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest vaktsineeriti teisetõhus doosiga vaid üks inimene.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 21.11.2022 surmaga lõppenud 2 780 haigusjuhtu ehk 0,46% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,8% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 371 (49,3%) ja naisi 1 409 (50,7%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhtude arv



Vaktsineerimine


46. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 122, pooleli oleva kuuriga isikuid 14 ning lõpetatud kuuriga isikuid 355.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



46. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 17, pooleli oleva kuuriga isikuid 1 ning lõpetatud kuuriga isikuid 23.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Haigestumuse intensiivsust püsib madalal tasemel, gripiviiruse püsivat levikut ei ole veel täheldatud. 46. nädal jooksul registreeriti 10 laboratoorselt kinnitatud gripijuhtu, nendest oli 9 A-gripiviirust ja 1 B-gripiviirust.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades.

Koostaja: Nakkushaiguste osakond

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

21.11.2022 seisuga tuvastati 228 uut HIV-nakkust, sh 112 (ehk 49,1%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

21.11.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimase kahe kuu jooksul ei ole uusi haigusjuhte lisandunud. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.